

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

# CAPIRI + BV療法

1. BV: 7.5mg/kg
2.  CPT-11(多型-)  200  150  125mg/m<sup>2</sup>  
 CPT-11(多型+)  150  125  100mg/m<sup>2</sup>
3. カペシタビン:
- 1.31m<sup>2</sup>未満  900mg/回 × 2/  
1.31~1.69m<sup>2</sup>  1200mg/回 × 2/  
1.69~2.07m<sup>2</sup>  1500mg/回 × 2/  
2.07m<sup>2</sup>以上  1800mg/回 × 2/  
減量時  600  900  1200  1500mg/回

主治医 &tagPatOrdDoc&  
**施行開始日**

施行回数:  コース  
前回実施日:   
PS:  0  1  2

## 投与方法

- ①45分 → ②15分 → ③90・60・30分 → ④ → ⑤90分 → ⑥ → ⑦経口: day1夕~14日間内服

\*④、⑥:フラッシュ

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	プロイメンド 150mg × 1 V 生食100 ml × 1 B	
②	アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 V
③	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ <u>0</u> mg	抜き取り量: <u>0.0</u> cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ★初回:90分 2回目:60分 3回目以降:30分
④	生食 50ml × 1 B	
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン <u>0</u> mg	抜き取り量: <u>0.0</u> cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B	
⑦経口	カペシタビン錠 300mg <u>0</u> mg/日	0 錠/(分2朝・夕) × 14日

