患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

CAPOX + BV療法

1. BV: 7.5mg/kg
2. L-OHP: ☐ 130 ☐ 100 ☐ 85mg/㎡
3. カペシタビン:
   - 1.36㎡未満: ☐ 1200mg/回×2/日
   - 1.36～1.66未満: ☐ 1500mg/回×2/日
   - 1.66～1.96未満: ☐ 1800mg/回×2/日
   - 1.96以上: ☐ 2100mg/回×2/日
   - 減量時: ☐ 600 ☐ 900 ☐ 1200 ☐ 1500 ☑ 1800mg/回

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

①45分 → ②15分 → ③90・60・30分 → ④ ⑤120分 → ⑥ ⑦経口:day1夕～14日間内服

*④、⑥:ﾌﾗｯｼｭ

	薬剤名・投与量		薬剤使用量
①	プロイメンド 150mg 生食 100ml	×1 V ×1 B	
②	アロキシ 0.75mg デカドロン 3.3mg	×1 ｷｯﾄ	1.65mg ×2 A
③	生食 100ml ベバシズマブ	×1 B 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V
④	生食 50ml	×1 B	
⑤	5%ブドウ糖液 250ml オキサリプラチン	×1 袋 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑥	生食 50ml	×1 B	
⑦経口	カペシタビン錠 300mg	0 mg/日	0 錠/(分2朝・夕) ×14日