

CPT-11 + Cetuximab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

1. セツキシマブ: 初回 400mg/m²
 2回目以降 250 200 150mg/m²

2. CPT-11: 150 120 100mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日:

施行回数: コース 回目
 前回実施日:
 PS: 0 1 2

投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	<input type="checkbox"/> 生食 100ml × 1 B <input type="checkbox"/> アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 19.8mg ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	6.6 mg × 3 V ☆セツキシマブ単独療法時は生食で！
② (初回:120分 以降60分)	生食 250ml × 1 B セツキシマブ <u>0 mg</u>	抜き取り量: <u>0.0 cc</u> 100 mg × 0 V ☆開始から15分間観察すること (infusion reactionに注意)
③	生食 100ml × 1 B	* 初回:60分、2回目以降:30分観察
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン <u>0 mg</u>	抜き取り量: <u>0.0 cc</u> 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B	

