

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

Capecitabine + BV療法

1. BV: 7.5mg/kg

2. カペシタビン:

1.36㎡未満: 1200mg/回 × 2/日

1.36~1.66㎡: 1500mg/回 × 2/日

1.66~1.96㎡: 1800mg/回 × 2/日

1.96㎡以上: 2100mg/回 × 2/日

減量時 600 900 1200 1500 1800mg/回

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS: 0 1 2

投与方法

①プライミング

②90・60・30分

③フラッシュ

④経口: day1夕~14日間内服

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V
③	生食 100ml × 1 B	
④経口	カペシタビン錠 300mg 0 mg/日	0 錠 / (分2朝・夕) × 14日

カペシタビン: day1夕~14日間内 7日間休薬



1コース