

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

FOLFIRI療法


- I-LV: 200mg/m²
- CPT-11: 150 120 100mg/m²
- 5-FU(bolus): 400 300 200mg/m²
- 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

主治医	&tagPatOrdDoc&
施行開始日	

施行回数: コース
 前回実施日:

PS: 0 1 2

投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	プロイメンド 150mg × 1 V 生食 100ml × 1 B	
②	アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 A
③	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 250 mg × 0 V
⑥ポンプ全量 100ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V 250 mg × 0 V
⑦	生食シリンジ × 1 筒	

