

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!


FOLFIRI + Aflibercept療法

- アフリベルセプト 4mg/kg 1段階減量: 2mg/kg
- I-LV: 200mg/m²
- CPT-11: 150 120 100mg/m²
- 5-FU(bolus): 400mg/m² 中止
- 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日

施行回数: コース
 前回実施日:
 PS: 0 1 2

投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	プロイメンド 150mg × 1 V 生食 100ml × 1 B	
②	アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 V
③	生食 50ml × 1 B	
④	生食 100ml × 1 B アフリベルセプト 0 mg ☆フィルターを使用すること!	抜き取り量: 0.0 cc 200 mg × 0 V 100 mg × 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B	
⑥	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑦	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑧	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑨ポンプ 全量100ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V 250 mg × 0 V
⑩	生食シリンジ × 1 筒	

