

# FOLFIRI + Cetuximab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

1. セツキシマブ:  初回: 400  2回目以降: 250mg/m<sup>2</sup>
2. I-LV 200mg/m<sup>2</sup>
3. CPT-11:  150  120  100mg/m<sup>2</sup>
4. 5-FU(bolus):  400  300  200mg/m<sup>2</sup>
5. 5-FU(div):  2400  2000  1600mg/m<sup>2</sup>

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日: \_\_\_\_\_

施行回数: \_\_\_\_\_ コース \_\_\_\_\_ 回目

前回実施日: \_\_\_\_\_

PS:  0  1  2

## 投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
<input checked="" type="checkbox"/>	プロイメンド 150mg × 1 V 生食 100ml × 1 B	
①	<input type="checkbox"/> アロキシ 0. 75mg デカドロン 9. 9mg(6.6mg × 1V、1.65mg × 2A) <input type="checkbox"/> 生食 100ml デカドロン 19. 8mg(6.6mg × 3V) ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	* セツキシマブ単剤時は生食 100ml・デカドロン 19.8mgで
② (初回: 120分 以降60分)	生食 250ml × 1 B セツキシマブ _____ 0 mg	抜き取り量: _____ 0.0 cc 100 mg × _____ 0 V * 開始から15分間観察すること(infusion reaction)に注意)
③	生食 100ml × 1 B	* 初回: 60分、2回目以降: 30分観察
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート _____ 0 mg	100 mg × _____ 0 V 25 mg × _____ 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン _____ 0 mg	抜き取り量: _____ 0.0 cc 100 mg × _____ 0 V 40 mg × _____ 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B 5-FU _____ 0 mg	抜き取り量: _____ 0.0 cc 250 mg × _____ 0 V
⑦ポンプ 全量100ml	5-FU _____ 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: _____ 0.0 cc 生食 _____ 0.0 cc 1000 mg × _____ 0 V 250 mg × _____ 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

