

# FOLFIRI + Ramucirumab療法


患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

- ラムシルマブ:  8mg/kg  1段階減量: 6mg/kg
- I-LV: 200mg/m<sup>2</sup>
- CPT-11:  150  120  100mg/m<sup>2</sup>
- 5-FU(bolus):  400  300  200mg/m<sup>2</sup>
- 5-FU(div):  2400  2000  1600mg/m<sup>2</sup>

主治医 &tagPatOrdDoc&  
 施行開始日

施行回数:  コース  
 前回実施日:   
 PS:  0  1  2

## 投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	プロイメンド 150mg × 1 V 生食 100ml × 1 B	
②	アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 V
③	生食 50ml × 1 B	
④	生食 250ml × 1 B ラムシルマブ 0 mg ☆フィルターを使用すること!	抜き取り量: 0.0 cc 500 mg × 0 V 100 mg × 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B	
⑥	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑦	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑧	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 250 mg × 0 V
⑨ポンプ 全量100ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V 250 mg × 0 V
⑩	生食シリンジ × 1 筒	

