

SIRB療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日: _____

1. BV: 7.5mg/kg
 2. CPT-11 150mg/m²
 1段階減量: 125mg/m² 2段階減量: 100mg/m²
 3. S-1

- < 1. 25m² 40mg/回 × 2/日
 1. 25~1. 5 50mg/回 × 2/日
 1. 5m² ≤ 60mg/回 × 2/日

減量 25mg/回 30mg/回 40mg/回 50mg/回

施行回数: _____ コース

前回実施日: _____

PS: 0 1 2

投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	プロイメンド 150mg × 1 V 生食 100ml × 1 B	
②	アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 V
③	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V
④	生食 100ml × 1 B	* 初回: 60分、2回目以降: 30分観察
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B	
⑦経口	S-1 0 mg/日	25 mg × 0 錠 20 mg × 0 錠/(分2朝・夕) × 14日

