

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

mFOLFOX6 + Cetuximab

1. セツキシマブ 初回: 400mg/m² 2回目以降: 250mg/m²
2. I-LV: 200mg/m²
3. L-OHP: 85 65 50mg/m²
4. 5-FU(bolus): 400 300 200mg/m²
5. 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日: _____

施行回数: _____ コース _____ 回目

前回実施日: _____

PS: 0 1 2

投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
<input checked="" type="checkbox"/>	プロイメンド 150mg × 1 V 生食 100ml × 1 B	
①	<input type="checkbox"/> アロキシ 0. 75mg デカドロン 9. 9mg (6.6mg × 1V、1.65mg × 2A) <input checked="" type="checkbox"/> 生食 100ml デカドロン 19. 8mg (6.6mg × 3A) ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	* セツキシマブ単独療法時は生食 100ml、デカドロン19.8mgで
② (初回120分 以降60分)	生食 250ml × 1 B セツキシマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V * 開始から15分間観察すること (infusion reaction) に注意
③	生食 100ml × 1 B	* 初回: 60分、2回目以降: 30分観察
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 250 mg × 0 V
⑦ポンプ 全量100ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V 250 mg × 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

