

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

# sLV5FU2 + BV療法

1. BV:  5mg  10mg/kg
2. I-LV: 200mg/m<sup>2</sup>
4. 5-FU(bolus):  400  300  200mg/m<sup>2</sup>
5. 5-FU(div):  2400  2000  1600mg/m<sup>2</sup>

主治医 &tagPatOrdDoc&


施行開始日:

施行回数: \_\_\_\_\_ コース

前回実施日: \_\_\_\_\_

PS:  0  1  2

## 投与方法



\*③: フラッシュ ⑦: CVロック

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 6.6mg × 1 V	
②	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ★初回: 90分 2回目: 60分 3回目以降: 30分
③	生食 50ml × 1 B	
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 250 mg × 0 V
⑥ポンプ 全量100ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V 250 mg × 0 V
⑦	生食シリンジ × 1 筒	

