

CAPOX + Trastuzumab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日

1. トラスツズマブ: 初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg
 (4週以上あいた際は初回投与量で投与)

2. L-OHP: 130 100 85mg/m²

3. カペシタビン(BSA別投与量):

1.36m²未満: 1200mg/回 × 2/日
 1.36~1.66未満: 1500mg/回 × 2/日
 1.66~1.96未満: 1800mg/回 × 2/日
 1.96m²以上: 2100mg/回 × 2/日

減量時: 600 900 1200 1500 1800mg/回

投与方法

施行回数: コース
 前回実施日:
 PS: 0 1 2



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	プロイメンド 150mg × 1 V 生食 100ml × 1 B	
②	アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 A
③	生食 250ml × 1 B トラスツズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解) 60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
④	生食 50ml × 1 B	
⑤	5%ブドウ糖 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B	
⑦経口	カペシタビン錠 300mg 0 mg/日	0 錠/(分2朝・夕) × 14日

カペシタビン: day1夕から14日間内服 7日間休薬

