

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

# CAPOX療法

1. L-OHP:  130  100  85mg/m<sup>2</sup>

2. カペシタビン:

1.36m<sup>2</sup>未満:  1200mg/回 × 2/日

1.36~1.66未満:  1500mg/回 × 2/日

1.66~1.96未満:  1800mg/回 × 2/日

1.96m<sup>2</sup>以上:  2100mg/回 × 2/日

減量時:  600  900  1200  1500  1800mg/回

主治医 &tagPatOrdDoc&


施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS:  0  1  2

## 投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	プロイメンド 150mg × 1 V 生食 100ml × 1 B	
②	デカドロロン 3.3mg アロキシ 0.75mg × 1 B	1.65mg × 2 A
③	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
④	生食50ml × 1 B	
⑤経口	カペシタビン錠 300mg 0 mg/日	0 錠/(分2朝・夕) × 14日

カペシタビン: day1夕から14日間内服 7日間休薬

