

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

Capecitabine + Trastuzumab療法

1. トラスツズマブ: 初回: 8mg/kg 2回目以降: 6mg/kg
2. カペシタビン: 2000mg/m²/日
- 1.36m²未満 1200mg/回 × 2/日
- 1.36~1.66未満 1500mg/回 × 2/日
- 1.66~1.96未満 1800mg/回 × 2/日
- 1.96m²以上 2100mg/回 × 2/日

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

減量時 600 900 1200 1500 1800mg/回

投与方法

施行回数:

前回実施日:

PS: 0 1 2

- ①プライミング ②初回: 90分 以降: 30分まで短縮可 ③フラッシュ ④経口 (当日夕から14日間内服)

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 250ml × 1 B トラスツズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解) 60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
③	生食 50ml × 1 B	
④経口	カペシタビン錠 300mg 0 mg/日	0 錠/(分2朝夕) × 14日

