患者ID	&tagPatNo&			
氏名	&tagPatKanaName&			
生年月日	&tagPatBirth&			
年齢	&tagPatage&			
性別	&tagPatSex&			
身長	&tagPatHeight&			
体重	&tagPatWeight&			
体表面積	#VALUE!			

## Ramucirumab + PTX療法

1. ラムシルマブ	8mg/kg		
	□ 1段階減量:6r	ng/kg 🗌 2	2段階減量:5mg/kg
2. PTX:	$80 \text{mg/m}^2$		%dose
	減量時:10mg/m <sup>2</sup>	ずつ減量(	60mg/㎡まで)
	施行回数:		コース
	前回実施日:		
	PS: 0	1	2

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

## 投与方法

①15分	>	②15分		③60分	>	④フラッシュ	⑤60分	>	6フラッシュ
------	---	------	--	------	---	--------	------	---	--------

	薬剤	呂∙投与ы	薬剤使用量	
1	アロキシ 0.75mg	×	1 B	
	デカドロン 6.6mg	×	1 V	
	生食 100ml	×	1 B	
2	ガスター 20mg	×	1 A	
	ポララミン 5mg	×	1 A	
	生食 250ml	×	1 B	抜き取り量: 0.0 cc
3	ラムシルマブ		0 mg	500 mg × 0 V
	☆フィルターを使用すること!			100 mg × 0 V
4	生食 50ml	×	1 B	
	5%ブドウ糖液 250ml	×	1 B	抜き取り量: 0.0 cc
5	パクリタキセル		0 mg	100 mg × 0 V
	☆フィルターを使用すること!			30 mg × 0 V
6	生食 50ml	×	1 B	

