

| | |
|------|------------------|
| 患者ID | &tagPatNo& |
| 氏名 | &tagPatKanaName& |
| 生年月日 | &tagPatBirth& |
| 年齢 | &tagPatAge& |
| 性別 | &tagPatSex& |
| 身長 | &tagPatHeight& |
| 体重 | &tagPatWeight& |
| 体表面積 | #VALUE! |

Ramucirumab + nab-PTX療法

1. ラムシルマブ 8mg/kg
 1段階減量: 6mg/kg 2段階減量: 5mg/kg

2. nab-PTX: 100mg/m² %dose
 1段階減量: 80mg/m² 2段階減量: 60mg/m²

施行回数: コース
 前回実施日:

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日

PS: 0 1 2

投与方法



| | 薬剤名・投与量 | 薬剤使用量 |
|---|--|---|
| ① | 生食 100ml × 1 B デカドロン 6.6mg × 1 V | |
| ② | 生食 100ml × 1 B ガスター 20mg × 1 A ポララミン 5mg × 1 A | |
| ③ | 生食 250ml × 1 B ラムシルマブ <input type="text"/> 0 mg ☆フィルターを使用すること! | 抜き取り量: 0.0 cc 500 mg × <input type="text"/> 0 V 100 mg × <input type="text"/> 0 V |
| ④ | 生食 50ml × 1 B | |
| ⑤ | 生食 100ml × 1 B アブラキサン® <input type="text"/> 0 mg ★フィルターは使用しないこと! | 抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × <input type="text"/> 0 V |
| ⑥ | 生食 50ml × 1 B | |

