

# SP + Trastuzumab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

1. トラスツズマブ:  初回 8mg/kg  2回目以降 6mg/kg
2. CDDP: 60mg/m<sup>2</sup> (10mg/m<sup>2</sup>ずつ減量)
3. S-1:
- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1.25m <sup>2</sup> 未満 | <input type="checkbox"/> 40mg/回 × 2/日 |
| 1.25~1.5未満            | <input type="checkbox"/> 50mg/回 × 2/日 |
| 1.5m <sup>2</sup> 以上  | <input type="checkbox"/> 60mg/回 × 2/日 |

主治医 &tagPatOrdDoc&  
 施行開始日


施行回数:  コース  
 前回実施日:

PS:  0  1  2

## 投与方法

day1

day2,3



		薬剤名・投与量			薬剤使用量			
day1 /	①	ソリタT3号G 500ml	×	1	B			
		ビカーボン 500ml	×	2	B			
	②	プロイメンド 150mg	×	1	V			
		生食 100ml	×	1	B			
	③	アロキシ 0.75mg	×	1	B			
		デカドロン 9.9mg				6.6mg × 1	V	1.65mg × 2A
	④	生食 250ml	×	1	B	抜き取り量: 0.0 cc		
		トラスツズマブ		0	mg	150 mg × 0	V (7.2cc/Vで溶解)	60 mg × 0
⑤	生食 500ml	×	1	B	抜き取り量: 0.0 cc			
	シスプラチン		0	mg	50 mg × 0	V	10 mg × 0	V
⑥	マンニトールS 300ml	×	1	B				
⑦	生食 500ml	×	2	B				
⑧経口	S-1		0	mg/日	25 mg × 0	錠	20 mg × 0	錠/(分2朝・夕) × 14日
day2,3 / /	①	ソリタT3号G 500ml	×	1	B			
		ビカーボン 500ml	×	2	B			
	②	生食 100ml	×	1	B			
デカドロン 6.6mg		×	1	V				
③	ビカーボン 500ml	×	2	B				

S-1: day1夕~14日間内服

7日間休薬



1コース