XP ± Trastuzumab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

1. トラスツズマブ: ☐ 初回:8mg/kg ☐ 2回目以降:6mg/kg
2. CDDP: 80mg/㎡ CDDPは10mg/㎡ずつ減量
3. カペシタビン: 2000mg/㎡/日
   - 1.36㎡未満 ☐ 1200mg/回×2/日
   - 1.36～1.66未満 ☐ 1500mg/回×2/日
   - 1.66～1.96未満 ☐ 1800mg/回×2/日
   - 1.96㎡以上 ☐ 2100mg/回×2/日

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

day1

①24時間

②45分 → ③15分 → ④初回:90分 以降:30分 → ⑤120分 → ⑥45分 → ⑦4時間 → ⑧経口:day1夕～14日間服用

day2,3

①24時間

②30分 → ③5時間

		薬剤名・投与量				薬剤使用量
day1 /	①	ソリタ-T3号G 500ml	×	1	B	
		ビカーボン 500ml	×	2	B	
	②	プロイメンド 150mg	×	1	V	
		生食 100ml	×	1	B	
	③	アロキシ 0.75mg	×	1	B	
		デカドロン 9.9mg				6.6mg ×1V 1.65mg ×2A
	④	生食 250ml	×	1	B	抜き取り量: 0.0 cc
		トラスツズマブ		0	mg	150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解)
						60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
	⑤	生食 500ml	×	1	B	抜き取り量: 0 cc
		シスプラチン		0	mg	50 mg × 0 V
						10 mg × 0 V
	⑥	マンニットールS 300ml	×	1	B	
	⑦	生食 500ml	×	2	B	
	⑧経口	カペシタビン				
				0	mg/日	300 mg × 錠/(分2朝・夕)×14日
day2,3 / /	①	ソリタ-T3号G 500ml	×	1	B	
		ビカーボン 500ml	×	2	B	
	②	生食 100ml	×	1	B	
		デカドロン 6.6mg	×	1	V	
	③	ビカーボン 500ml	×	2	B	

カペシタビン: 14日間内服 | 7日間休薬

day1 day15 day21

1コース