

|      |                  |
|------|------------------|
| 患者ID | &tagPatNo&       |
| 氏名   | &tagPatKanaName& |
| 生年月日 | &tagPatBirth&    |
| 年齢   | &tagPatage&      |
| 性別   | &tagPatSex&      |
| 身長   | &tagPatHeight&   |
| 体重   | &tagPatWeight&   |
| 体表面積 | #VALUE!          |


# FOLFIRINOX療法

1. I-LV: 200mg/m<sup>2</sup>
2. L-OHP:  85     65     50mg/m<sup>2</sup>
3. CPT-11:  180     150     120mg/m<sup>2</sup>
4. 5-FU(bolus):  400mg/m<sup>2</sup>
5. 5-FU(div):  2400     1800     1200mg/m<sup>2</sup>

主治医    &tagPatOrdDoc&  
 施行開始日

施行回数:    コース  
 前回実施日:  
 PS:     0     1     2

## 投与方法



|                 | 薬剤名・投与量                              | 薬剤使用量  |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| ①               | 生食 100ml × 1 B                       |  |
| ②               | プロイメンド 150mg × 1 V<br>生食 100ml × 1 B |  |
| ③               | アロキシ 0.75mg × 1 B<br>デカドロン 9.9mg     | 6.6mg × 1V    1.65mg × 2A                                |
| ④               | 5%ブドウ糖液 250ml × 1 B<br>オキサリプラチン 0 mg | 抜き取り量: 0.0 cc<br>100 mg × 0 V<br>50 mg × 0 V             |
| ⑤               | 5%ブドウ糖液 250ml × 1 B<br>レボホリナート 0 mg  | 抜き取り量: 100 mg × 0 V<br>25 mg × 0 V                       |
| ⑥               | 5%ブドウ糖液 250ml × 1 B<br>イリノテカン 0 mg   | 抜き取り量: 0.0 cc<br>100 mg × 0 V<br>40 mg × 0 V             |
| ⑦               | 生食 50ml × 1 B<br>5-FU 0 mg           | 抜き取り量: 0.0 cc<br>250 mg × 0 V                            |
| ⑧ポンプ<br>全量100ml | 5-FU 0 mg<br>生食 100ml × 1 B          | 抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc<br>1000 mg × 0 V<br>250 mg × 0 V |
| ⑨               | 生食シリンジ × 1 筒                         |  |

