

患者ID &tagPatNo&
氏名 &tagPatKanaName&
生年月日 &tagPatBirth&
年齢 &tagPatage&
性別 &tagPatSex&
身長 &tagPatHeight&
体重 &tagPatWeight&
体表面積 #VALUE!

FOLFIRI + Cetuximab療法

1. セツキシマブ: ☐ 初回: 400 ☐ 2回目以降: 250mg/m²

2. I-LV 200mg/m²

3. CPT-11: ☐ 150 ☐ 120 ☐ 100mg/m²

4. 5-FU(bolus): ☐ 400 ☐ 300 ☐ 200mg/m²

5. 5-FU(div): ☐ 2400 ☐ 2000 ☐ 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日:

施行回数:

コース

 回目

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

①30分

②120分/60分

③60分/30分

④⑤120分

⑥15分

⑦46時間

⑧CVロック

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	☐ アロカリス 235mg・アロキシ O. 75mg デカドロン 9. 9mg(6.6mg×1V、1.65mg×2A) ☐ 生食 100ml デカドロン 19. 8mg(6.6mg×3V) ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	* セツキシマブ単剤時は生食 100ml・デカドロン 19.8mgで
② (初回: 120分 以降60分)	生食 250ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc
	セツキシマブ 0 mg	100 mg × 0 V
		* 開始から15分間観察すること(infusion reaction)に注意)
③	生食 100ml × 1 B	* 初回: 60分、2回目以降: 30分観察
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B	
	レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V
		25 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc
	イリノテカン 0 mg	100 mg × 0 V
		40 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc
	5-FU 0 mg	250 mg × 0 V
⑦ポンプ 全量95ml	5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc
	生食 100ml × 1 B	1000 mg × 0 V
		250 mg × 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

