

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

主治医	&tagPatOrdDoc&
施行開始日:	

エンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ療法

1. セツキシマブ:	初回	☐ 400mg/m ²
(1週間に1回点滴)	2回目以降	☐ 250 ☐ 200 ☐ 150mg/m ²

2. エンコラフェニブ:	☐ 300 ☐ 225 ☐ 150mg/回 (1日1回内服)
3. ビニメチニブ:	☐ 45 ☐ 30 ☐ 15mg/回 (1日2回内服)

施行回数:	コース
前回実施日:	
PS:	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

①30分	②120分/60分	③60分/30分	経口: day1夕~day8朝まで7日間内服
------	-----------	----------	------------------------

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 100ml × 1 B デカドロン 19.8mg ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	6.6 mg × 3 V
② (初回: 120分以降60分)	生食 250ml × 1 B セツキシマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V ☆開始から15分間観察すること (infusion reactionに注意)
③	生食 100ml × 1 B	* 初回: 60分、2回目以降: 30分観察
経口	エンコラフェニブ 300 mg/日	75 mg × 4 錠/1日1回(夕食後)
経口	ビニメチニブ 90 mg/日	15 mg × 6 錠/(分2 朝・夕食後)