

XP ± Trastuzumab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 1. トラスツズマブ: | ☐ 初回:8mg/kg | ☐ 2回目以降:6mg/kg |
| 2. CDDP: | 80mg/m ² | CDDPは10mg/m ² ずつ減量 |
| 3. カペシタビン: | 2000mg/m ² /日 | |
| 1.36m ² 未満 | ☐ 1200mg/回 × 2/日 | |
| 1.36～1.66未満 | ☐ 1500mg/回 × 2/日 | |
| 1.66～1.96未満 | ☐ 1800mg/回 × 2/日 | |
| 1.96m ² 以上 | ☐ 2100mg/回 × 2/日 | |

施行回数: コース

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

day1

day2,3

Figure 1: Comparison of treatment regimens for COVID-19. The diagram illustrates two different treatment schedules, each represented by a sequence of colored arrows indicating duration and timing.

Regimen 1 (Left):

- ① 24時間 (24 hours)
- ② 30分 (30 minutes)
- ③ 初回: 90分 以降: 30分 (Initial: 90 minutes, then 30 minutes)
- ④ 120分 (120 minutes)
- ⑤ 45分 (45 minutes)
- ⑥ 4時間 (4 hours)

Regimen 2 (Right):

- ① 24時間 (24 hours)
- ② 30分 (30 minutes)
- ③ 5時間 (5 hours)

Common Instruction (Bottom):

- ⑦ 経口: day1 夕～14日間服用 (Oral intake: day 1 evening to 14 days of oral intake)

		薬剤名・投与量				薬剤使用量			
day1 / ⑦経口	①	ソリター-T3号G 500ml	×	1	B				
		ビカーボン 500ml	×	2	B				
	②	アロカリス 235mg	×	1	V	6.6mg × 1V 1.65mg × 2A			
		アロキシ 0.75mg	×	1	B				
		デカドロン 9.9mg							
	③	生食 250ml	×	1	B	抜き取り量:	<u>0.0</u> cc		
		トラスツズマブ	<u>0</u>	mg		150 mg	×	0 V	(7.2cc/Vで溶解)
	④	生食 500ml	×	1	B	抜き取り量:	<u>0</u> cc		
シスプラチン		<u>0</u>	mg		50 mg	×	0 V		
					10 mg	×	0 V		
⑤	マンニトールS 300ml	×	1	B					
⑥	生食 500ml	×	2	B					
day2,3 / / ③	①	ソリター-T3号G 500ml	×	1	B				
		ビカーボン 500ml	×	2	B				
	②	生食 100ml	×	1	B				
		デカドロン 6.6mg	×	1	V				
③	ビカーボン 500ml	×	2	B					

カペシタビン：14日間内服

7日間休薬

day1

dav15

day21

1コース

