

患者ID

&tagPatNo&

氏名

&tagPatKanaName&

生年月日

&tagPatBirth&

年齢

&tagPatAge&

性別

&tagPatSex&

身長

&tagPatHeight&

体重

&tagPatWeight&

体表面積

#VALUE!

FOLFOXIRI + BV療法

1. BV: 5mg/kg
2. I-LV: 200mg/m²
3. CPT-11:

150

125

100mg/m²
4. L-OHP:

85

65

50mg/m²
5. 5-FU(div):

2400

2000

1600mg/m²

主治医

&tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数:

前回実施日:

PS:

0

1

投与方法

- ①
- ②90・60・30分
- ③30分
- ④90分
- ⑤⑥120分
- ⑦46時間
- ⑧

*①:プライミング ⑧:CVロック

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ★初回:90分 2回目:60分 3回目以降:30分
③	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 9.9mg	6.6mg × 1 V 1.65mg × 2A
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑥	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑦ポンプ 全量95ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V 250 mg × 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

