

患者ID

&tagPatNo&

氏名

&tagPatKanaName&

生年月日

&tagPatBirth&

年齢

&tagPatAge&

性別

&tagPatSex&

身長

&tagPatHeight&

体重

&tagPatWeight&

体表面積

#VALUE!

FOLFIRI + BV療法

1. BV:

☐ 5mg

☐ 10mg/kg

2. I-LV: 200mg/m²

3. CPT-11:

☐ 150

☐ 120

☐ 100mg/m²

4. 5-FU(bolus):

☐ 400

☐ 300

☐ 200mg/m²

5. 5-FU(div):

☐ 2400

☐ 2000

☐ 1600mg/m²

主治医

&tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数:

コース

前回実施日:

PS:

☐ 0

☐ 1

☐ 2

投与方法

①30分

②90・60・30分

③

④⑤120分

⑥15分

⑦46時間

⑧

*③:フラッシュ ⑧:CVロック

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン3.3mg	1.65 mg × 2 V
②	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ★初回:90分 2回目:60分 3回目以降:30分
③	生食 50ml × 1 B	
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 250 mg × 0 V
⑦ポンプ 全量95ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V 250 mg × 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

