

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

Capecitabine + BV療法

1. BV: 7.5mg/kg

2. カペシタビン:

1.36㎡未満: ☐ 1200mg/回 × 2/日

1.36～1.66㎡: ☐ 1500mg/回 × 2/日

1.66～1.96㎡: ☐ 1800mg/回 × 2/日

1.96㎡以上: ☐ 2100mg/回 × 2/日

減量時 ☐ 600 ☐ 900 ☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 1800mg/回

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

①プライミング

②90・60・30分

③フラッシュ

④経口: day1タ～14日間内服

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V
③	生食 100ml × 1 B	
④経口	カペシタビン錠 300mg 0 mg/日	0 錠/(分2朝・タ) × 14日

