

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

Ramucirumab + PTX療法

1. ラムシルマブ	☐ 8mg/kg
	☐ 1段階減量: 6mg/kg ☐ 2段階減量: 5mg/kg
2. PTX:	80mg/m ² %dose
	減量時: 10mg/m ² ずつ減量(60mg/m ² まで)
施行回数:	コース
前回実施日:	

主治医	&tagPatOrdDoc&
施行開始日	

PS:	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2
-----	--

投与方法

①15分	②15分	③初回60分/2回目以降30分投与可	④フラッシュ	⑤60分	⑥フラッシュ
------	------	--------------------	--------	------	--------

	薬剤名・投与量			薬剤使用量	
①	アロキシ 0.75mg	×	1 B		
	デカドロン 6.6mg	×	1 V		
②	生食 100ml	×	1 B		
	ガスター 20mg	×	1 A		
	ポララミン 5mg	×	1 A		
③	生食 250ml	×	1 B	抜き取り量:	0.0 cc
	ラムシルマブ		0 mg	500 mg ×	0 V
	☆フィルターを使用すること！			100 mg ×	0 V
④	生食 50ml	×	1 B		
⑤	5%ブドウ糖液 250ml	×	1 B	抜き取り量:	0.0 cc
	パクリタキセル		0 mg	100 mg ×	0 V
	☆フィルターを使用すること！			30 mg ×	0 V
⑥	生食 50ml	×	1 B		

