

患者ID

&tagPatNo&

氏名

&tagPatKanaName&

生年月日

&tagPatBirth&

年齢

&tagPatage&

性別

&tagPatSex&

身長

&tagPatHeight&

体重

&tagPatWeight&

体表面積

#VALUE!

CPT-11 + Cetuximab療法

1. セツキシマブ:

初回

☐ 400mg/m²

2回目以降

☐ 250

☐ 200

☐ 150mg/m²

2. CPT-11:

☐ 150

☐ 120

☐ 100mg/m²

主治医

&tagPatOrdDoc&

施行開始日:

施行回数:

コース

回目

前回実施日:

PS:

☐ 0

☐ 1

☐ 2

投与方法

①30分

②120分/60分

③60分

④90分

⑤フラッシュ

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	☐ 生食 100ml × 1 B ☐ アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 19.8mg ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	6.6 mg × 3 V ☆セツキシマブ単独療法時は生食で！
② (初回:120分 以降60分)	生食 250ml × 1 B セツキシマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V ☆開始から15分間観察すること (infusion reactionに注意)
③	生食 100ml × 1 B	* 初回:60分、2回目以降:30分観察
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B	

