

患者ID

&tagPatNo&

氏名

&tagPatKanaName&

生年月日

&tagPatBirth&

年齢

&tagPatage&

性別

&tagPatSex&

身長

&tagPatHeight&

体重

&tagPatWeight&

体表面積

#VALUE!

Capecitabine + Trastuzumab療法

1. トラスツズマブ:

☐

初回: 8mg/kg

☐

2回目以降: 6mg/kg

2. カペシタビン:

2000mg/m²/日

1.36m²未満

☐

1200mg/回 × 2/日

1.36～1.66未満

☐

1500mg/回 × 2/日

1.66～1.96未満

☐

1800mg/回 × 2/日

1.96m²以上

☐

2100mg/回 × 2/日

主治医

&tagPatOrdDoc&

施行開始日

減量時

☐

600

☐

900

☐

1200

☐

1500

☐

1800mg/回

投与方法

施行回数:

コース

前回実施日:

PS:

☐

0

☐

1

☐

2

①プライミング

②初回: 90分以降: 30分まで短縮可

③フラッシュ

④経口(当日夕から14日間内服)

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 250ml × 1 B トラスツズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解) 60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
③	生食 50ml × 1 B	
④経口	カペシタビン錠 300mg 0 mg/日	0 錠/(分2朝夕) × 14日

