

患者ID &tagPatNo&

氏名 &tagPatKanaName&

生年月日 &tagPatBirth&

年齢 &tagPatAge&

性別 &tagPatSex&

身長 &tagPatHeight&

体重 &tagPatWeight&

体表面積 #VALUE!

mFOLFOX6 + Cetuximab

1. セツキシマブ ☐ 初回: 400mg/m² ☐ 2回目以降: 250mg/m²

2. I-LV: 200mg/m²

3. L-OHP: ☐ 85 ☐ 65 ☐ 50mg/m²

4. 5-FU(bolus): ☐ 400 ☐ 300 ☐ 200mg/m²

5. 5-FU(div): ☐ 2400 ☐ 2000 ☐ 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日:

施行回数:


コース

回目

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	☒ アロカリス 235mg・アロキシ 0. 75mg デカドロン 9. 9mg (6.6mg × 1V、1.65mg × 2A) ☐ 生食 100ml デカドロン 19. 8mg (6.6mg × 3A) ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	* セツキシマブ単独療法時は生食 100ml、デカドロン19.8mgで
② (初回120分 以降60分)	生食 250ml × 1 B セツキシマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V * 開始から15分間観察すること (infusion reaction) に注意
③	生食 100ml × 1 B	* 初回: 60分、2回目以降: 30分観察
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 250 mg × 0 V
⑦ポンプ 全量95ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V 250 mg × 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

