

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

# CAP+B-mab

(CAPOXIRI+B-mabのメンテナンス)

1. B-mab: 7.5mg/kg

2. Capecitabine初回量(BSA別投与量)

1.31㎡未満:  900mg/回 × 2/日

1.31~1.69㎡未満:  1200mg/回 × 2/日

1.69~2.07㎡未満:  1500mg/回 × 2/日

2.07以上:  1800mg/回 × 2/日

減量時  600  900  1200  1500mg/回

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS:  0  1  2

## 投与方法

- ① **②30分** ③フラッシュ **④経口(当日夕から14日間内服)**

①:プライミング

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食50ml × 1 B	
②	生食100ml × 1 B アバスチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V
③	生食50ml × 1 B	
④経口	ゼローダ錠300mg 0 mg/日	0 錠/(分2朝・夕) × 14日

カペシタビン 2W投

1W休

day1                      day8                      day15                      day21

B-mab



3週毎

1コース