

| | |
|------|------------------|
| 患者ID | &tagPatNo& |
| 氏名 | &tagPatKanaName& |
| 生年月日 | &tagPatBirth& |
| 年齢 | &tagPatage& |
| 性別 | &tagPatSex& |
| 身長 | &tagPatHeight& |
| 体重 | &tagPatWeight& |
| 体表面積 | #VALUE! |

CAPIRI + BV療法

1. BV: 7.5mg/kg

2. CPT-11(多型-) 200 150 125mg/m²
 CPT-11(多型+) 150 125 100mg/m²

3. カペシタビン:

1.31m²未満 900mg/回 × 2/日
1.31~1.69m² 1200mg/回 × 2/日
1.69~2.07m² 1500mg/回 × 2/日
2.07m²以上 1800mg/回 × 2/日

減量時 600 900 1200 1500mg/回

主治医 &tagPatOrdDoc&
施行開始日 _____

施行回数: _____ コース
前回実施日: _____
PS: 0 1 2

投与方法

①30分 → ②90・60・30分 → ③ ④90分 → ⑤ ⑥経口: day1夕~14日間内服

*③、⑤:フラッシュ

| | 薬剤名・投与量 | 薬剤使用量 |
|-----|---|--|
| ① | アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg | 1.65 mg × 2 V |
| ② | 生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg | 抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ★初回:90分 2回目:60分 3回目以降:30分 |
| ③ | 生食 50ml × 1 B | |
| ④ | 5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg | 抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V |
| ⑤ | 生食 50ml × 1 B | |
| ⑥経口 | カペシタビン錠 300mg 0 mg/日 | 0 錠/(分2朝・夕) × 14日 |

