

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

# CAPOX + Trastuzumab+ Pembrolizumab療法

1. ペムブロリズマブ: 200mg/body
  2. トラスツズマブ:  初回 8mg/kg  2回目以降 6mg/kg  
(4週以上あいた際は初回投与量で投与)
  3. L-OHP:  130  100  75  50mg/m<sup>2</sup>
  4. カペシタビン(BSA別投与量):
    - 1.36m<sup>2</sup>未満:  1200mg/回 × 2/日
    - 1.36~1.66未満:  1500mg/回 × 2/日
    - 1.66~1.96未満:  1800mg/回 × 2/日
    - 1.96m<sup>2</sup>以上:  2100mg/回 × 2/日
- 減量時:  600  900  1200  1500  1800mg/回

主治医 &tagPatOrdDoc&  
 施行開始日

## 投与方法

施行回数:   
 前回実施日:   
 PS:  0  1  2



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 100ml × 1 B ペムブロリズマブ 200 mg ☆フィルターを使用すること!	抜き取り量: 8.0 cc 100 mg × 2 V
③	生食 50ml × 1 B	
④	生食 250ml × 1 B トラスツズマブ 0 mg 蒸留水 20ml × 2 A	抜き取り量: 0.0 cc 150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解) 60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
⑤	生食 50ml × 1 B	
⑥	アロカリス235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 A
⑦	5%ブドウ糖 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑧	生食 50ml × 1 B	
⑨経口	カペシタビン錠 300mg mg/日	0 錠/(分2朝・夕) × 14日

カペシタビン:day1夕から14日間内服 7日間休薬

