

CAPOX + Zolbetuximab療法


患者ID &tagPatNo&
 氏名 &tagPatKanaName&
 生年月日 &tagPatBirth&
 年齢 &tagPatage&
 性別 &tagPatSex&
 身長 &tagPatHeight&
 体重 &tagPatWeight&
 体表面積 #VALUE!

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日

1. ゾルベツキシマブ: 初回 800mg/m²
 2回目以降 600mg/m²
 2. L-OHP: 130 100 85mg/m²
 3. カペシタビン(BSA別投与量):
 1.36m²未満: 1200mg/回×2/日
 1.36～1.66未満: 1500mg/回×2/日
 1.66～1.96未満: 1800mg/回×2/日
 1.96m²以上: 2100mg/回×2/日
 減量時: 600 900 1200 1500 1800mg/回

投与方法

施行回数: コース
 前回実施日:
 PS: 0 1 2



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロカリス235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 9.9mg ポララミン注 5mg × 1 A	1.65mg × 2A 6.6mg × 1V
②	<input type="checkbox"/> 初回 生食 500ml (体表面積≥1.4) <input type="checkbox"/> 初回 体表面積<1.4の場合 生食 250ml <input type="checkbox"/> 2回目以降 生食 250ml ゾルベツキシマブ 0 mg ☆フィルターを使用すること	ビロイ抜き取り量: 0.0 cc 300 mg × 0 V (注射用水15.0cc/Vで溶解) 100 mg × 0 V (注射用水5.0cc/Vで溶解) *ビロイの抜き取り量を母液に追加(水抜き不要)
③	生食 100ml × 1 B	
④	5%ブドウ糖 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B	
⑥経口	カペシタビン錠 300mg 0 mg/日	0 錠/(分2朝・夕) × 14日

カペシタビン: day1夕から14日間内服 7日間休薬

