

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!


# CAPOXIRI+B-mab

- 1. B-mab: 7.5mg/kg
- 2. CPT-11:  200     150     125mg/m<sup>2</sup>
- 3. L-OHP:  130     100     85mg/m<sup>2</sup>
- 4. Capecitabine (BSA別投与量)
  - 1.31m<sup>2</sup>未満     900mg/回 × 2/日
  - 1.31~1.69m<sup>2</sup>未満     1200mg/回 × 2/日
  - 1.69~2.07m<sup>2</sup>未満     1500mg/回 × 2/日
  - 2.07m<sup>2</sup>以上     1800mg/回 × 2/日
- 減量時  600     900     1200     1500mg/回

主治医    &tagPatOrdDoc&  
 施行開始日

施行回数:  /6コース(最大8コース)  
 前回実施日:   
 PS:  0     1     2

### 投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg × 1 キット デカドロン 9.9mg ブスコパン注 20mg × 1 A ガスター注射液 20mg × 1 A	6.6 mg × 1 V 1.65 mg × 2 V
②	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ★初回:90分 2回目:60分 3回目以降:30分
③	生食 50ml × 1 B	
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B	
⑦経口	カペシタビン錠 300mg 0 mg/日	0 錠/(分2朝・夕) × 14日

