

患者ID &tagPatNo&  
 氏名 &tagPatKanaName&  
 生年月日 &tagPatBirth&  
 年齢 &tagPatage&  
 性別 &tagPatSex&  
 身長 &tagPatHeight&  
 体重 &tagPatWeight&  
 体表面積 #VALUE!

# CDDP+5FU 【ポンプ】

1. CDDP: 80mg/m<sup>2</sup>  
 2. 5FU: 800mg/m<sup>2</sup>

100  80  75%dose  
 %dose

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS:  0  1  2

## 投与方法 day1

①ソリタT3G、ビカーボンはバッグに混注し、6時間かけて

☆5FUは24時間×5日間継続

②30分

③120分

④45分

⑤4時間

①30分

②6時間かけて

day2,3,4,5

		薬剤名・投与量	薬剤使用量
Day1	①メイン	ソリタT3号G輸液500ml × 1 B ビカーボン輸液500ml × 2 袋 ☆5FUはポンプ(全量240mL)で24時間×5日間 5FU <u>0 mg</u> 生食250ml × 1 B	ソリタT3G、ビカーボンはバッグに混注し、6時間かけて投与 抜き取り量: <u>0.0 cc</u> 1000 mg × <u>0 V</u> 生食: <u>240.0 cc</u>
	②側管	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ点滴静注バッグ0.75mg × 1 キット デカドロン9.9mg	6.6mg × 1 V 1.65mg × 2A
	③側管	生食500ml × 1 B シスプラチン <u>0 mg</u>	抜き取り量: <u>0 cc</u> 50 mg × <u>0 V</u> 10 mg × <u>0 V</u>
	④側管	マンニトールS注射液300ml × 1 瓶	
	⑤側管	生食500ml × 2 B	
Day2,3 4,5	①側管	生食100ml × 1 B デカドロン6.6mg × 1 V	
	②側管	ソリタT3号G500ml × 1 B ビカーボン輸液500ml × 2 袋	バッグに混注し、6時間かけて投与

