患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

CPT-11 + Cetuximab療法

1. セツキシマブ: 初回 ☐ 400mg/㎡
2回目以降
☐ 250 ☐ 200 ☐ 150mg/㎡

2. CPT-11: ☐ 150 ☐ 120 ☐ 100mg/㎡

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日:

施行回数: ___ コース ___ 回目

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

①30分 → ②120分/60分 → ③60分 → ④90分 → ⑤ﾌﾗｯｼｭ

	薬剤名・投与量		薬剤使用量
①	☐ 生食 100ml	× 1 B	
	☐ アロキシ 0.75mg	× 1 B	
	デカドロン 19.8mg		6.6 mg × 3 V
	ポララミン 5mg	× 1 A	
	ガスター 20mg	× 1 A	☆セツキシマブ単独療法時は生食で！
② （初回:120分 以降60分）	生食 250ml	× 1 B	抜き取り量: 0.0 cc
	セツキシマブ	0 mg	100 mg × 0 V
			☆開始から15分間観察すること （infusion reactionに注意）
③	生食 100ml	× 1 B	＊初回:60分、2回目以降:30分観察
④	5%ブドウ糖液 250ml	× 1 B	抜き取り量: 0.0 cc
	イリノテカン	0 mg	100 mg × 0 V
			40 mg × 0 V
⑤	生食 50ml	× 1 B