

mFOLFOX6 + Panitumumab療法


患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

- パニツムマブ 初回: 6.0mg/kg
 1段階減量: 4.8mg/kg 2段階減量: 3.6mg/kg
- I-LV: 200mg/m²
- L-OHP: 85 65 50mg/m²
- 5-FU(bolus): 400 200mg/m²
- 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日: _____

施行回数: _____
 前回実施日: _____
 PS: 0 1 2

投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 100ml × 1 B パニツムマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ☆インラインフィルターを使用すること!
③	生食 100ml × 1 B	☆初回は60分観察。異常無ければ2回目以降はフラッシュで
④	プロイメンド 150mg × 1 V 生食 100ml × 1 B	
⑤	アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 V
⑥	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑦	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑧	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 250 mg × 0 V
⑨ポンプ 全量100ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V 250 mg × 0 V
⑩	生食シリンジ × 1 筒	

