患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

Capecitabine + Trastuzumab療法

1. トラスツズマブ: ☐ 初回:8mg/kg ☐ 2回目以降:6mg/kg
2. カペシタビン: 2000mg/㎡/日

1.36㎡未満	☐ 1200mg/回×2/日
1.36～1.66未満	☐ 1500mg/回×2/日
1.66～1.96未満	☐ 1800mg/回×2/日
1.96㎡以上	☐ 2100mg/回×2/日

減量時 ☐ 600 ☐ 900 ☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 1800mg/回

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

①ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ ②初回:90分 以降:30分まで短縮可 ③ﾌﾗｯｼｭ ④経口(当日夕から14日間内服)

	薬剤名・投与量		薬剤使用量
①	生食 50ml	× 1 B	
②	生食 250ml	× 1 B	抜き取り量: 0.0 cc
	トラスツズマブ	0 mg	150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解)
			60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
	蒸留水 20ml	× 2 A	
③	生食 50ml	× 1 B	
④経口	カペシタビン錠 300mg	0 mg/日	0 錠/(分2朝夕)×14日