

FOLFIRI + Cetuximab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

1. セツキシマブ: 初回: 400 2回目以降: 250mg/m²
2. I-LV 200mg/m²
3. CPT-11: 150 120 100mg/m²
4. 5-FU(bolus): 400 300 200mg/m²
5. 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日: _____

施行回数: _____ コース _____ 回目

前回実施日: _____

PS: 0 1 2

投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	<input type="checkbox"/> アロリス 235mg・アロキシ O. 75mg デカドロン 9. 9mg (6.6mg × 1V, 1.65mg × 2A) <input type="checkbox"/> 生食 100ml デカドロン 19. 8mg (6.6mg × 3V) ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	* セツキシマブ単剤時は生食 100ml・デカドロン 19.8mgで
② (初回: 120分 以降60分)	生食 250ml × 1 B セツキシマブ _____ 0 mg	抜き取り量: _____ 0.0 cc 100 mg × _____ 0 V * 開始から15分間観察すること (infusion reaction) に注意
③	生食 100ml × 1 B	* 初回: 60分、2回目以降: 30分観察
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート _____ 0 mg	100 mg × _____ 0 V 25 mg × _____ 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン _____ 0 mg	抜き取り量: _____ 0.0 cc 100 mg × _____ 0 V 40 mg × _____ 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B 5-FU _____ 0 mg	抜き取り量: _____ 0.0 cc 1000 mg × _____ 0 V
⑦ポンプ 全量120ml	5-FU _____ 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: _____ 0.0 cc 生食 _____ 0.0 cc 1000 mg × _____ 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

