

FOLFIRI + Panitumumab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

1. パニツムマブ: 6. 0mg/kg
 1段階減量: 4. 8mg/kg 2段階減量: 3. 6mg/kg
2. I-LV: 200mg/m²
3. CPT-11: 150 120 100mg/m²
4. 5-FU(bolus): 400 300 200mg/m²
5. 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日: _____

施行回数: _____ コース

前回実施日: _____

PS: 0 1 2

投与方法



* ①:プライミング ⑤フラッシュ ⑩CVロック

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 100ml × 1 B パニツムマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ☆インラインフィルターを使用すること!
③	生食 100ml × 1 B	☆初回は60分観察。 異常無ければ2回目以降はフラッシュで
④	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロロン 3.3mg	1.65 mg × 2 V
⑤	生食 50ml × 1 B	
⑥	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑦	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑧	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑨ポンプ 全量120ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑩	生食シリンジ × 1 筒	

