患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

FOLFIRI + Ramucirumab療法

1. ラムシルマブ: ☐ 8mg/kg ☐ 1段階減量:6mg/kg
2. l-LV: 200mg/㎡
3. CPT-11: ☐ 150 ☐ 120 ☐ 100mg/㎡
4. 5-FU(bolus): ☐ 400 ☐ 300 ☐ 200mg/㎡
5. 5-FU(div): ☐ 2400 ☐ 2000 ☐ 1600mg/㎡

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

①30分 → ② → ③初回60分/2回目以降30分投与 → ④ → ⑤⑥120分 → ⑦15分 → ⑧46時間 → ⑨

＊②、④:ﾌﾗｯｼｭ ⑨CVﾛｯｸ

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 V
②	生食 50ml × 1 B	
③	生食 250ml × 1 B ラムシルマブ 0 mg ☆フィルターを使用すること！	抜き取り量: 0.0 cc 500 mg × 0 V 100 mg × 0 V
④	生食 50ml × 1 B	
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑥	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑦	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑧ポンプ 全量120ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑨	生食シリンジ × 1 筒