

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

FOLFOXIRI + BV療法

- BV: 5mg/kg
- I-LV: 200mg/m²
- CPT-11: 150 125 100mg/m²
- L-OHP: 85 65 50mg/m²
- 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日

施行回数:
 前回実施日:
 PS: 0 1

投与方法



*①:プライミング ⑧:CVロック

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ★初回:90分 2回目:60分 3回目以降:30分
③	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 9.9mg	6.6mg × 1 V 1.65mg × 2A
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑥	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑦ポンプ 全量120ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

