

# FOLFOXIRI + Cetuximab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

1. セツキシマブ:  初回: 400  2回目以降: 250mg/m<sup>2</sup>  
 1段階減量: 200mg/m<sup>2</sup>  2段階減量: 150mg/m<sup>2</sup>
2. I-LV 200mg/m<sup>2</sup>
3. CPT-11:  150  125  100mg/m<sup>2</sup>
4. L-OX:  85  65  50mg/m<sup>2</sup>
5. 5-FU(div):  2400  2000  1600mg/m<sup>2</sup>

主治医 &tagPatOrdDoc&  
 施行開始日: \_\_\_\_\_

施行回数: \_\_\_\_\_ /12コース  
 前回実施日: \_\_\_\_\_  
 PS:  0  1  2

## 投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	<input type="checkbox"/> アロリス 235mg・アロキシ O. 75mg <input type="checkbox"/> デカドロン 9. 9mg (6.6mg × 1V, 1.65mg × 2A) <input type="checkbox"/> 生食 100ml <input type="checkbox"/> デカドロン 19. 8mg (6.6mg × 3V) ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	* セツキシマブ単剤時は生食 100ml・デカドロン 19.8mgで
③ (初回: 120分 以降60分)	生食 250ml × 1 B セツキシマブ _____ 0 mg	抜き取り量: _____ 0.0 cc 100 mg × _____ 0 V * 開始から15分間観察すること(infusion reactionに注意)
④	生食 100ml × 1 B	* 初回: 60分、2回目以降: 30分観察
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン _____ 0 mg	抜き取り量: _____ 0.0 cc 100 mg × _____ 0 V 40 mg × _____ 0 V
⑥	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート _____ 0 mg	100 mg × _____ 0 V 25 mg × _____ 0 V
⑦	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン _____ 0 mg	抜き取り量: _____ 0.0 cc 100 mg × _____ 0 V 50 mg × _____ 0 V
⑧ポンプ 全量120ml	5-FU _____ 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: _____ 0.0 cc 生食 _____ 0.0 cc 1000 mg × _____ 0 V
⑨	生食シリンジ × 1 筒	

