患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

IRIS + BV療法

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日：

1. BV： 5mg/kg
2. CPT-11： ☐ 100mg/㎡ ☐ 1段階減量：80mg/㎡ ☐ 2段階減量：60mg/㎡
3. TS-1：
   - ☐ ＜1．25㎡ 40mg/回×2/日
   - ☐ 1．25～1．5 50mg/回×2/日
   - ☐ 1．5㎡≦ 60mg/回×2/日

TS1減量 ☐ 25mg/回 ☐ 30mg/回 ☐ 40mg/回 ☐ 50mg/回

施行回数： コース

前回実施日：

PS： ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

①30分 → ②90・60・30分 → ③ → ④90分 → ⑤ → ⑥経口：day1夕～14日間内服

*③、⑤：ﾌﾗｯｼｭ

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 V
②	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量： 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V
③	生食 50ml × 1 B	
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg .	抜き取り量： 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B	
⑥経口	S-1 0 mg/日	25 mg × 0 錠 20 mg × 0 錠/（分2朝・夕）×14日