

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

Ramucirumab + nab-PTX療法

1. ラムシルマブ 8mg/kg
 1段階減量: 6mg/kg 2段階減量: 5mg/kg

2. nab-PTX: 100mg/m² %dose
 1段階減量: 80mg/m² 2段階減量: 60mg/m²

施行回数: コース

前回実施日:

PS: 0 1 2

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 100ml × 1 B デカドロロン 6.6mg × 1 V	
②	生食 100ml × 1 B ガスター 20mg × 1 A ポララミン 5mg × 1 A	
③	生食 250ml × 1 B ラムシルマブ <input type="text"/> 0 mg ☆フィルターを使用すること！	抜き取り量: <input type="text"/> 0.0 cc 500 mg × <input type="text"/> 0 V 100 mg × <input type="text"/> 0 V * 初回は60分、2回目以降30分で投与可
④	生食 50ml × 1 B	
⑤	生食 50ml × 1 B アブラキサン® <input type="text"/> 0 mg ★フィルターは使用しないこと！	抜き取り量: <input type="text"/> 0.0 cc 100 mg × <input type="text"/> 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B	

