| | |
|---|---|
| 患者ID | &tagPatNo& |
| 氏名 | &tagPatKanaName& |
| 生年月日 | &tagPatBirth& |
| 年齢 | &tagPatage& |
| 性別 | &tagPatSex& |
| 身長 | &tagPatHeight& |
| 体重 | &tagPatWeight& |
| 体表面積 | #VALUE! |

# Ramucirumab単独療法

1. ラムシルマブ ☐ 8mg/kg
☐ 1段階減量：6mg/kg ☐ 2段階減量：5mg/kg

施行回数： コース
前回実施日：

**主治医** &tagPatOrdDoc&
**施行開始日**

PS： ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

**投与方法**

①15分 → ③初回60分/2回目以降30分投与可 → ③ﾌﾗｯｼｭ

| | 薬剤名・投与量 | | | 薬剤使用量 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 生食 100ml | × | 1 B | |
| | ガスター 20mg | × | 1 A | |
| | ポララミン 5mg | × | 1 A | |
| ② | 生食 250ml | × | 1 B | 抜き取り量： 0.0 cc |
| | ラムシルマブ | | mg | 500 mg × 0 V |
| | ☆フィルターを使用すること！ | | | 100 mg × 0 V |
| ③ | 生食 50ml | × | 1 B | |