| | |
|---|---|
| 患者ID | &tagPatNo& |
| 氏名 | &tagPatKanaName& |
| 生年月日 | &tagPatBirth& |
| 年齢 | &tagPatage& |
| 性別 | &tagPatSex& |
| 身長 | &tagPatHeight& |
| 体重 | &tagPatWeight& |
| 体表面積 | #VALUE! |

# SIRB療法

**主治医** &tagPatOrdDoc&

**施行開始日：**

1. BV： 7.5mg/kg
2. CPT−11 ☐ 150mg/㎡
   ☐ 1段階減量：125mg/㎡ ☐ 2段階減量：100mg/㎡
3. S−1
   ☐ ＜1．25㎡ 40mg/回×2/日
   ☐ 1．25〜1．5 50mg/回×2/日
   ☐ 1．5㎡≦ 60mg/回×2/日

減量 ☐ 25mg/回 ☐ 30mg/回 ☐ 40mg/回 ☐ 50mg/回

施行回数： コース

前回実施日：

PS： ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

**投与方法**

①30分 → ②90・60・30分 → ③60分 → ④90分 → ⑤ ⑥経口：day1夕〜14日間内服

| | 薬剤名・投与量 | 薬剤使用量 |
|---|---|---|
| ① | アロカリス 235mg × 1 V<br>アロキシ 0.75mg × 1 B<br>デカドロン 3.3mg | 1.65 mg × 2 V |
| ② | 生食 100ml × 1 B<br>ベバシズマブ 0 mg | 抜き取り量： 0.0 cc<br>400 mg × 0 V<br>100 mg × 0 V |
| ③ | 生食 100ml × 1 B | ＊初回：60分、2回目以降：30分観察 |
| ④ | 5%ブドウ糖液 250ml × 1 B<br>イリノテカン 0 mg<br>. | 抜き取り量： 0.0 cc<br>100 mg × 0 V<br>40 mg × 0 V |
| ⑤ | 生食 50ml × 1 B | |
| ⑥経口 | S−1<br>0 mg/日 | 25 mg × 0 錠<br>20 mg × 0 錠/（分2朝・夕）×14日 |