SP + Trastuzumab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

1. トラスツズマブ: ☐ 初回 8mg/kg ☐ 2回目以降 6mg/kg
2. CDDP: 60mg/㎡（10mg/㎡ずつ減量）
3. S-1:
   - 1.25㎡未満 ☐ 40mg/回×2/日
   - 1.25～1.5未満 ☐ 50mg/回×2/日
   - 1.5㎡以上 ☐ 60mg/回×2/日

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

day1

①24時間

②15分 → ③初回:90分 以降:30分 → ④120分 → ⑤45分 → ⑥4時間

⑦経口:day1夕～14日間内服

day2,3

①24時間

②30分 → ③5時間

		薬剤名・投与量		薬剤使用量
day1 /	①	ソリタT3号G 500ml × 1 B ビカーボン 500ml × 2 B		
	②	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 9.9mg		6.6mg × 1 V 1.65mg× 2A
	③	生食 250ml × 1 B トラスツズマブ 0 mg		抜き取り量: 0.0 cc 150 mg × 0 V（7.2cc/Vで溶解） 60 mg × 0 V（3cc/Vで溶解）
	④	生食 500ml × 1 B シスプラチン 0 mg		抜き取り量: 0.0 cc 50 mg × 0 V 10 mg × 0 V
	⑤	マンニットールS 300ml × 1 B		
	⑥	生食 500ml × 2 B		
	⑦経口	S-1 0 mg/日		25 mg × 0 錠 20 mg × 0 錠/（分2朝・夕）×14日
day2,3 / /	①	ソリタT3号G 500ml × 1 B ビカーボン 500ml × 2 B		
	②	生食 100ml × 1 B デカドロン 6.6mg × 1 V		
	③	ビカーボン 500ml × 2 B		

S-1: day1夕～14日間内服 | 7日間休薬

day1 — day1 — day21

1コース