

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

TAS-102+B-mab

1. B-mab: 5.0mg/kg

2. TAS-102: 35mg/m²/回 × 2/日

減量時 30mg/m²/回 25mg/m²/回 20mg/m²/回

* TAS-102: 50mg/日は朝食後20mg、夕食後30mgとする

施行回数: コース

前回実施日:

PS: 0 1 2

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日:

投与方法

- ① ② 90・60・30分 ③ 60分 ④ 1日2回朝・夕食後、5日間内服、9日間休薬

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食50ml × 1 B	
②	生食100ml × 1 B アバステン <input type="text"/> 0 mg	抜き取り量: <input type="text"/> 0.0 cc 400 mg × <input type="text"/> 0 V 100 mg × <input type="text"/> 0 V
③	生食100ml × 1 B	☆初回は60分観察 2回目以降: 30分観察
④経口	ロンサーフ配合錠 <input type="text"/> 0 mg/日	15 mg × <input type="text"/> 0錠 20 mg × <input type="text"/> 0錠 /(分2朝・夕) × 5日

