患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

Trastuzumab+Pertuzumab療法

1. ペルツズマブ: ☐ 初回:840mg/body ☐ 2回目以降:420mg/body
2. トラスツズマブ ☐ 初回:8mg/kg ☐ 2回目以降:6mg/kg

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

①15分 → ②初回:60分 以降:30分まで短縮 → ③観察 → ④初回90分 以降30分まで短縮 → ⑤観察

	薬剤名・投与量		薬剤使用量
①	生食 100ml デカドロン 6.6mg ポララミン 5mg	× 1 B × 1 V × 1 A	※初回および発熱時にカロナール錠500を処方 [汎用→処置→カロナール錠500]にてコスト処理
②	生食 250ml ペルツズマブ	× 1 B 0 mg	抜き取り量: 0 ml 420 mg × 0 V
③	生食 100ml	× 1 B	初回は60分観察、2回目以降30分まで短縮可
④	生食 250ml トラスツズマブ	× 1 B 0 mg	抜き取り量: 0.0 ml 150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解) 60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
⑤	生食 100ml	× 1 B	初回は60分観察、2回目以降30分まで短縮可